

## **ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗАНИНГ ЎЗФА-711 НАВИНИ ТУРЛИ ХУДУДЛАРДА ХОСИЛДОРЛИК БЕЛГИСИ КЎРСАТКИЧИНИНГ ТАХЛИЛИ**

**Ҳакимов А.Э., Эргашев О.Р.**

*Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти*

**Аннотация:** В данной статье был изучен средневолокнистый сорт хлопчатника Ўзфа-711 в территориях с различными почвенно-климатическими условиями, и данные о фенотипическом проявлении признаков специфичности в популяции растений были сопоставлены с данными шаблонных сортов в различных территориях.

**Annotation:** In this article, the medium-fiber cotton variety O‘zfa-711 was studied in territories with different soil and climatic conditions, and data on the phenotypic manifestation of specificity signs in the plant population were compared with data from template varieties in different territories.

Маълумки, ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос тупроқ-иклим шароити мавжуд бўлиб, шу ҳудудда парваришланган ғўза навлари ўзининг морфо-биологик хусусиятлари ҳисобига турлича ривожланади. Бироқ, бундай навларни яратишда қатор қийинчиликлар мавжудки, улар жумласига ота-она жуфтликларини омадли танлаш омили, белгининг кўп генлар билан бошқарилиши, ажратилган популяцияни қисқа фурсатда тўғри баҳолашга имкон бермаслиги, кўплаб ҳолатларда ҳосилдорликнинг мослашувчанлик қобиляти билан уйғунлаша олмаслиги, биологик ва механик ифлосланиш ҳолатининг мавжудлиги, мутациялар, навнинг потенциал имкониятларини сақлаб туриш учун мақсадли танловлар олиб борилмаганда навнинг умри қисқа бўлиши ва ҳоказолар киради [1; 128–Б].

Ўсимлик маҳсулдорлиги ғўзанинг асосий ва анча мураккаб хусусияти саналади. Кўсақлар сони ва оғирлиги, кўсақдаги чаноклар сони, кўсақдаги чигитлар миқдори ва 1000 дона чигит вазнига боғлиқ бўлади. Бундай хусусият учун генотипик ва фенотипик ўзгарувчанликнинг юқори коэффициенти хос бўлади [2; 127–Б].

Маълумки, ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос тупроқ-иклим шароити мавжуд бўлиб, шу ҳудудда парваришланган ғўза навлари ўзининг морфо-биологик хусусиятлари ҳисобига турлича ривожланади. Бироқ, бундай навларни яратишда қатор қийинчиликлар мавжудки, улар жумласига ота-она жуфтликларини омадли танлаш омили, белгининг кўп генлар билан бошқарилиши, ажратилган популяцияни қисқа фурсатда тўғри баҳолашга имкон бермаслиги, кўплаб ҳолатларда ҳосилдорликнинг мослашувчанлик қобиляти билан уйғунлаша олмаслиги, биологик ва механик ифлосланиш ҳолатининг мавжудлиги, мутациялар, навнинг потенциал имкониятларини сақлаб туриш учун мақсадли танловлар олиб борилмаганда навнинг умри қисқа бўлиши ва ҳоказолар киради [4; 128–Б].

Селекция ва репродукция иссиқхоналарда ғўзани жадал ўстириш ва ривожлантириш агротехник технологиясини ишлаб чиқилиб, тизмалар кўпинча стандарт навлар билан таққосланганда қимматли-хўжалик белгилари бўйича устун туради. Тола узунлиги бўйича тезпишар Наманган навидан устундир. С-6524 нави билан солиштирганда тизмаларнинг кўрсаткичлари бир хил ёки биров устунлиги сезилади. Умуман олганда фитотрон, иссиқхона мажмуасидан фойдаланиб ғўза селекциясининг жараёнини 3 йилга қисқартириш мумкин. Бу эса ғўзанинг тезпишар, серҳосил, вилтга чидамли, толасининг технологик хусусиятлари яхши бўлган янги навларни жадал суръатлар билан яратиш имкониятини туғдириб, ғўза селекциясида катта иқтисодий самара бериши келтирилган [23; 8-11-б.].

Маълумки, ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос тупроқ-иқлим шароити мавжуд бўлиб, шу ҳудудда парваришланган ғўза навлари ўзининг морфо-биологик хусусиятлари ҳисобига турлича ривожланади. Бироқ, бундай навларни яратишда қатор қийинчиликлар мавжудки, улар жумласига ота-она жуфтликларини омадли танлаш омили, белгининг кўп генлар билан бошқарилиши, ажратилган популяцияни қисқа фурсатда тўғри баҳолашга имкон бермаслиги, кўплаб ҳолатларда ҳосилдорликнинг мослашувчанлик қобиляти билан уйғунлаша олмаслиги, биологик ва механик ифлосланиш ҳолатининг мавжудлиги, мутациялар, навнинг потенциал имкониятларини сақлаб туриш учун мақсадли танловлар олиб борилмаганда навнинг умри қисқа бўлиши ва ҳоказолар киради [74; 128–Б].

Ќўза навлари устида кўп сонли изланишлар яратувчилик ишлар олиб борилганлигига қарамадан улар таркибида узлуксиз рўй бериб турадиган модификацион ўзгарувчанлик ва уни генетик гомеостаз такомиллашувига ижобий таъсири манбаларда жуда кам ёритилган, ҳозирги замон талабларига жавоб берадиган мукамал ишланмалар системаси яратилмаган. Ваҳоланки, парвариш қилиш шароити таъсирида айрим белгилар бўйича юзага келган ўзгарувчанлик улкан аҳамият касб этади, яъни популяция динамикаси, гетерогенлик, гетерозиготалик (гетероморфизм) популяцион гомеостазни ҳар томонлама чуқурроқ ўрганиш назарий ва амалий селекция учун муҳим жараёнлардан ҳисобланади [109; 68-71–С].

Ҳар қандай навнинг хўжалик аҳамиятига эга бўлган миқдорий белгиларининг шаклланиши узлуксиз давом этадиган динамик характерга эга бўлиб, кўп сонли асосий ва модификатор генлар ёрдамида тартибланади. Демак, миқдорий белгиларнинг популяцион генетикаси танлашни генетик назарияси тўғрисидаги ишланмаларни кучайтириш зарур. Ўсимликларнинг ўсиш ва ривожланиш даврида (онтогенезида) мавсумий биотиплар яратилиб туриши-табиий ва биологик қонуният бўлиб, навларнинг шароитга мосланиш имкониятини кенгайтиради.

Ҳосил шохининг характери бўйича ва пахта толасининг чиқими ҳамда узунлигини ўзгариши авлодларнинг ташқи муҳитга бўлган таъсирланиш меъёри чегарасида сақланди. Фенотипларнинг ўзгарувчанлик нисбати популяцион гомеостазни такомиллашуви учун генетик ва фенотипик ҳар хиллик имкониятини бунёд этади. Ташқи муҳитнинг доимий ўзгариб туриши натижасида яратиладиган ўзгарувчанлик кўлами кенгайган модификация – популяция таркибидаги дифференциация, полимеризация ва интеграция жараёнларига ижобий таъсир этади.

Ҳар қандай навнинг хўжалик аҳамиятига эга бўлган миқдорий белгиларининг шаклланиши узлуксиз давом этадиган динамик характерга эга бўлиб, кўп сонли асосий ва модификатор генлар ёрдамида тартибланади. Демак, миқдорий белгиларнинг популяцион генетикаси танлашни генетик назарияси тўғрисидаги ишланмаларни кучайтириш зарур. Ўсимликларнинг ўсиш ва ривожланиш даврида (онтогенезида) мавсумий биотиплар яратилиб туриши-табиий ва биологик қонуният бўлиб, навларнинг шароитга мосланиш имкониятини кенгайтиради.


**Тадқиқот ашёси:** Ўзфа-711 ғўза навининг ҳосилдорлик белгиси кўрсаткичлари 2019-2021 йилларда турли тупроқ иқлим шароитларида ўстирилган популяциялари ўсимликларида акс эттирган маълумотлар мазкур тадқиқотнинг ашёси ҳисобланади.

**Тадқиқот услублари** Тажриба давомида намуналарнинг ҳосилдорлик кўрсаткичлари таҳлили қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш давлат комиссиясининг услуги, статистик таҳлиллари эса Б.А. Доспехов услуги асосида амалга оширилди.

**Натижалар:** Ќўзанг ЎзФА-711 ғўза навининг таҳлилдаги белгисининг турли тупроқ иқлим шароитларида намоён этган кўрсаткичларини қуйидаги маълумотларни асосида аниқланди.

*1-жадвал*

**ЎзФА-711 ғўза нави ўсимликларини турли худудларда ўстирилганида намоён этган ҳосилдорлик кўрсаткичлари.**



Ишлаб чиқариш ва қишлоқ хўжалик тараққиёти генетик ва селекционерлар олдида глобал муаммони, яъни замонавий талабларга жавоб берадиган янги ғўза навларини яратиш ва жорий этишга боғлиқ. Бу муаммонинг ечими, ғўза навларининг бунёд этилишида генетик қонуниятларни ўрганиш даражасига, дурагай популяциларининг генотипик бойитилишига ва қимматли биотипларни танлаб олинишига боғлиқ.

Ўзанинг “ЎзФА-711” нав популяциясида ҳосилдорлик кўрсаткич турли худудларда ўстирилганда намоён этган ҳосилдорлик кўрсаткичлари стандарт навлар билан таққослаганда 16 та нав синаш участкаларидан олинган малумотларга асосланган ҳолда энг юқори кўрсаткични, Каттақўрғонда с/т Бухоро-102 навидан 11.3 с/га, Фарғонада с/т С-6524 навидан 3.4 с/га, Бешарикда с/т С-8290 навидан 6.8 с/га юқори бўлганлигини кузатишимиз мумкин. Мазкур нав ўсимликларини турли худудларда ўстирилганида намоён этган ҳосилдорлик кўрсаткичлари стандарт навлар билан таққослаганда ижобий кўрсаткичларни қайд этди.

**Адабиётлар**

- 1.** Аккужин Д.А., Машарипова Р.Б., Жуманиязов Ф.Қ. Диаллел чатиштириш тизимида ғўза навларининг комбинатсион қобилиятини ўрганиш. // Хоразм Маъмун академиясининг ривожланиш истиқболлари мавзусидаги республика илмий конференцияси материаллари тўплами. Хива, 2017, – Б.128.
- 2.** Ибрагимов П.Ш., Аллашов Б.Д., Амантурдиев Ш.Б. Ғўза селекциясида мураккаб дурагайлаш. // Фан, Т. 2010, – Б.127.
- 3.** Аккужин Д.А., Машарипова Р.Б., Жуманиязов Ф.Қ. Диаллел чатиштириш тизимида ғўза навларининг комбинатсион қобилиятини ўрганиш. // Хоразм Маъмун академиясининг ривожланиш истиқболлари мавзусидаги республика илмий конференцияси материаллари тўплами. Хива, 2017, – Б.128.
- 4.** Гулямов К., Максудов З. Возможность экологически отдаленной гибри-дизации хлопчатника и ионизирующей радиации в создании новообра-зований практической селекции // Научн.тр. ТашСХИ. 1971.Вып.22, – С.109–114.
- 5.** Аккужин Д.А., Машарипова Р.Б., Жуманиязов Ф.Қ. Диаллел чатиштириш тизимида ғўза навларининг комбинацион қобилиятини ўрганиш. // Хоразм Маъмун академиясининг ривожланиш истиқболлари мавзусидаги республика илмий конференцияси материаллари тўплами. Хива, 2017, – Б.128.
- 6.** Фадеева Т.С. Типы популяции растений и методы их изучения. В.сб.: «Популяции растений», Изд-во ЛГУ, 1979, – С.68-71